

ALERTA SOBRE FIEBRE AMARILLA**VIAJEROS A BRASIL**

SOCIEDAD LATINOAMERICANA DE MEDICINA DEL VIAJERO

- LA FIEBRE AMARILLA ES UNA ENFERMEDAD VIRAL QUE PUEDE PROVOCAR CASOS GRAVES CON DESENLACE FATAL.
- AUNQUE SE PERMANEZCA POCAS HORAS EN AREAS DE TRANSMISIÓN ACTIVA DE FIEBRE AMARILLA, SE ESTÁ EXPUESTO AL RIESGO DE CONTRAER LA ENFERMEDAD.
- LA VACUNA CONTRA FIEBRE AMARILLA CONSTITUYE LA MEDIDA MÁS EFECTIVA DE PREVENCIÓN.
- **LAS PERSONAS QUE VIAJEN A BRASIL (*) DEBEN ESTAR VACUNADAS CONTRA FIEBRE AMARILLA AL MENOS 10 DÍAS ANTES DE VISITAR EL DESTINO.** ES IMPORTANTE EVITAR LAS PICADURAS DE MOSQUITO UTILIZANDO REPELENTES, ROPAS CLARAS, MANGAS Y PANTALONES LARGOS.
- CONSULTE ANTES DE VIAJAR A BRASIL PARA EVALUAR SI NECESITA LA VACUNA y SI PUEDE RECIBIRLA.
- SI TIENE CONTRAINDICADA LA VACUNA POR ALGÚN MOTIVO NO VIAJE A LAS AREAS DE TRANSMISION ACTIVA DEL VIRUS (*).
- **POR LA SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA ACTUAL, SE RECOMIENDA EVITAR LOS VIAJES A ILHA GRANDE.**
- **SI REGRESA DE BRASIL O DE UN CRUCERO QUE HAYA ESTADO EN ALGÚN PUERTO DE ESE PAÍS y TIENE FIEBRE EN LOS ÚLTIMOS 14 DÍAS,** CONSULTE A SU MÉDICO O CENTRO DE SALUD EN FORMA INMEDIATA. HAGA REFERENCIA SOBRE EL VIAJE AL MÉDICO TRATANTE.

(*) ATENCION:

Las áreas antiguas e históricas de vacunación de fiebre amarilla en Brasil se mantienen como recomendación de vacuna para todos los viajeros con indicación.

Actualmente, por avance de la circulación del virus de la fiebre amarilla a otras regiones y estados brasileiros, se recomienda la vacunación para los viajeros con indicación a los siguientes destinos:


- Estado de Río de Janeiro: Se recomienda la vacunación en todo el estado, incluida la ciudad de Río de Janeiro y especialmente Ilha Grande en el municipio de Angra dos Reis.
- Estado de Minas Gerais: Se recomienda la vacunación en todo el estado.
- Estado de San Pablo: Se recomienda la vacunación en todo el estado, incluida la ciudad de San Pablo.
- Estado de Espírito Santo: Se recomienda la vacunación en todo el estado, incluida la ciudad de Vitória.
- Estado de Bahía: La extensión de las áreas de riesgo para la transmisión de fiebre amarilla incluye los siguientes municipios: Alcobasa, Belmonte, Canavieiras, Caravelas, Ilheus, Itacare, Mucuri, Nova Visosa, Porto Seguro, Prado, Santa Cruz Cabralia, Una Urusuca, Almadina, Una época, Arataca, Barra do Chosa, Barro Preto, Belo Campo, Buerarema, Caatiba, Camacan, Candido Ventas, Coaraci, CondeUba, Cordeiros, Encruzilhada, Eunápolis, Firmino Alves, Floresta Azul, Guaratinga, Ibicarai, Ibicui, Ibirapua, Itabela, Itabuna, Itagimirim, Itaju do Colonia, Itajuípe, Itamaraju, Itambe, Itanhem, Itape, Itapebi, Itapetinga, Itapitanga, Itarantim, Itororo, Jucurusu, Jussari, Lajedao, Macarani, Maiquinique, Mascote, Medeiros Neto, Nova Canaa, Pau Brasil, Piripa, Planalto, Posoes, Potiragua, Ribeirão do Largo, Santa Cruz da Vitoria, Santa Luzia, São José da Vitoria, Teixeira de Freitas, Tremedal, Vereda, Vitoria da Conquista, Agua Fria, Acajutiba, Aiquara, Alagoinhas, Amelia Rodrigues, Amargosa, Anguera, Antonio Cardoso, Apora, Apuarema, Aracas, Aracatu, Aramari, Aratuípe, Aurelino Leal, Barra da Estiva, Barra do Rocha, Barrocas, Biritinga, Buceo de la Paz, Buceo de la Sierra, BomJesus da Serra, Cuevas, Cabezas do Paraguacu, Cachoeira, Caetanos, Cairu, Camacari, Camamu, Candeal, Candeias, Caraibas, Conde, Concedas de Sincora, Coracade María, Cra- volandia, Cruz das Almas, DarioMeira, Dias de Ávila, Dom Macedo Costa, Elisio Medrado, Entre Ríos, Esplanada, Feira de Santana, Gandú, Gongogi, Governador Mangabeira, Guajeru, Ibirapitanga, Ibirataia, Igrapiuna, Iguai, Inhambupe, Ipecaeta, Ipiauí, Ipira, Irajuba, Iramaia, Irara, Itaberaba, Itagi, Itagiba, Itamari, Itanagra, Itaparica, Itaquara, Itatim, Itirucu, Itubera, Jacaraci, Jaguaquara, Jaguaripe, Jandaira, Jequie, Jiquirica, Jitauna, Lafaiete Coutinho, Lajedo do Tabocal, Lamarao, Lauro de Freitas, Licinio de Almeida, Madre de Deus, Maetinga, ManoelVitorino, Marta, Maracas, Maragogipe, Marcionilio

Estas recomendaciones están sujetas a revisión según la evolución de la situación epidemiológica.

24/03/2018

Souza, Mata de Sao Joao, Milagres, Mirante, Mortugaba, Muniz Ferreira, Mutuipe, Nazare, Nilo Pecanha, Nueva Ibia, Nova Itarana, Ouricangas, Pedrao, Pindai, Pirai do Norte, Planaltino, Pojuca, Presidente Janio Quadros, Presidente Tancredo Neves, Rafael Jambeiro, Riachão do Jacuípe, Río Real, Sao Félix, Sao Felipe Sao Francisco do Conde, São Gonçalo dos Campos, São Miguel das Matas, San Sebastián do Passe, Salinas da Margarida, Salvador, Santa Bárbara, Santa Inés, Santa Teresinha, Santanópolis, Santo Amaro, Santo Antonio de Jesús, Santo Estevão, Sapeacu, Saubara, Sebastián Laranjeiras, Serra Preta, Serrinha, SimoesFilho, Tanhacu, Tanquinho, Taperoa, Teodoro Sampaio, Teofilandia, Teolandia, Terra Nova, Ubaira, Ubaitaba, Ubata, Urandi, Valença, Varzedo, Vera Cruz y Wenceslau Guimaraes.

Áreas con recomendación para Vacuna contra Fiebre Amarilla en Brasil



<https://ecdc.europa.eu/en/publications-data/yellow-fever-distribution-and-areas-risk-brazil-13-march-2018>

Estas recomendaciones están sujetas a revisión según la evolución de la situación epidemiológica.

24/03/2018